만성 경막하 혈종 수술 설명 및 동의서

환자의 이름 :
주민등록번호 :
주 소 :

진단명

가. 귀하의 현재상태 : 만성 경막하 혈종의 의심이 있습니다.

나. 발생빈도 : 인구 100,000당 1-2명으로 50세 이상에서 호발합니다.

다. 증상 : 대개 노년층에서 발생하고 외상 후 증상의 발현까지의 기간이 일정치 않으며 고유증상이나 징후가 없습니다. 초기증상으로는 광범위하고 지속적인 두통, 구토, 유두부종과, 경도의 반신마비증세를 보입니다. 정신착란이나 기억력장애가 주 증상으로 나타날 수 있고 언어장애가 동반되기도 합니다. 점차 두개강 내압이 상승되어 의식이 혼미해 지면서 동측의 동공이 산대되고 안검하수등의 증세와 뇌간 마비증세가 나타나는데 수술을 하지 않으면 사망하게 됩니다.

진단 방법

방사선학 진단방법

① 단순 X-선 촬영
② 컴퓨터 단층촬영
③ 자기공명영상촬영

진단명 및 진단방법에 대하여 들었습니다. **서명 :** **(인)**

치료 방법

1) 수술적치료
뇌손상에 수반되는 후유증을 줄이려면 조기에 수술을 하는 것이 바람직합니다.

2) 수술방법
① 개두술(craniotomy)
② 천공술(Trephination)

치료 방법에 대하여 들었습니다. **서명 :** **(인)**

예후

수술 후 제반 증상은 좋아졌으나 CT상 대부분 잔류혈종이 있는데 몇 주간에 걸쳐 점차 흡수됩니다. 그러나 실제 혈종피막에서 출혈이 되어 재수술을 해야 하는 경우가 있으므로 재발이 의심이 되면 CT를 촬영합니다.
수술 후 간질발작이 10%에서 보고되므로 항경련제를 투여합니다.

예후에 대하여 들었습니다. **서명 :** **(인)**

시술 후의 후유증 내지 합병증

혈종의 위치나 술전의 환자의 상태, 수술시기에 따른 병의 자연적인 진행에 따라 다르지만 의식장애, 경련, 운동장애, 감각마비, 술후 출혈, 뇌혈관압박등의 증세에 따른 뇌허혈 증세가 발현되기도 하며 감염에 의한 증세가 나타나기도 합니다. 장기적으로 의식의 소실이 동반되는 경우나 내과적 문제(폐렴, 심부전, 콩팥부전, 간부전, 패혈증등)가 발생하는 경우에는 환자의 상태는 급격히 악화되기도 합니다.
수술후 수술당시 의식이 없거나 반 혼수상태일 경우 13%, 명료하거나 기면상태일 경우 5%의 사망률을 보이며 수술 사망률은 10%이하이며 약 75%는 치유되어 정상적인 생활을 할 수 있습니다.

시술 후의 후유증에 대하여 들었습니다. **서명 :** **(인)**

귀하의 경우 현재 다음과 같은 특이 사항이 있습니다.

1) _____
2) _____

년 월 일

주치의사 : _____ (인)
면허번호 : _____

서약

본인과 보호자는 만성경막하혈종의 치료를 위한 수술에 따른 합병증에 대하여 충분히 이해하였으므로 수술후의 후유증 발생의 위험을 감수하고 본 수술을 신청합니다.수술에 따른 모든 지시사항을 충실히 이행하며 주치의 및 시술의사의 지시와 판단에 전적으로 협조할 것을 서약합니다.

귀하의 증상과 치료 및 후유증에 관한 상세한 설명을 들었다면 **들었음,** _____
본 동의서 사본을 받았으면 **받았음** 이라고 자필로 기재해 주십시오. _____

본 동의서는 잘 보관하십시오.

년 월 일

환 자 : _____ (인)
보호자(법정대리인) : _____ (인)